

Tableau 3. Évolution réelle de l'utilisation des herbicides dans la production de maïs

| | | Maïs | Maïs f. | Soya | Orge | Blé | Cér.m. | Avoine | Total | Indice de pression herbicides |
|---|------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|-----------|-------------------------------|
| Superficies cultivées ('000 ha) | 1992 | 308 000 | 34 000 | 32 000 | 164 000 | 38 000 | 29 000 | 109 000 | 714 000 | |
| | 2001 | 435 500 | 52 000 | 148 000 | 159 500 | 36 500 | 31 000 | 93 000 | 955 500 | |
| Matière active théorique (kg/ha) ¹ | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,34 | |
| Matière active totale théorique ('000 kg) | 1992 | 924 000 | 102 000 | 96 000 | 98 400 | 22 800 | 17 400 | 65 400 | 1 326 000 | 1,86 |
| | 2001 | 1 306 500 | 156 000 | 444 000 | 95 700 | 21 900 | 18 600 | 55 800 | 2 098 500 | 2,20 |
| Évolution théorique : (2 098 500 – 1 326 000)/1 326 | | | | | | | | | 58% | |
| Matière active réelle ('000 kg) | 1992 | | | | | | | | 1 962 892 | 2,75 |
| | 2001 | | | | | | | | 1 712 868 | 1,79 |
| Évolution réelle : (1 579 000 – 1 734 000)/1 579 | | | | | | | | | -13% | -35% |
| Évolution réelle combinée : 58 % - (-13 %) | | | | | | | | | 71% | |